

0,3 ml/d**Gallimune® Se + St**

Dobra praksa vakcinacije



1. Povezivanje boce (vaccine) sa brizgalicom, priključna kanila omogućava protok emulzije vaccine. Temperatura vaccine treba da bude oko 20°C.



2. Osetiti punjenje cevi i brizgalice emulzijom vaccine, zatim proveriti da li je pravilno postavljena igla i to veličine 18 G x 1/4" (1.25 x 6 mm) ili 18 G x 1/2" (1.25 x 12 mm).



3. Aplikacija u grudnu, pektoralnu muskulaturu. Izvršiti lokalizaciju tačke za intramuskularnu aplikaciju vaccine, aplikovati što je više moguće kako bi se izbegla trbušna duplja i jetra.



4. Svaka pojedinačna aplikacija dostavlja uvek istu dozu od 0.3ml vaccine u grudnu muskulaturu. Povremeno promeniti iglu kako bih se izbegle povrede.



5. Aplikacija u nožnu muskulaturu (batak). Lokalizacija tačke za intramuskularnu aplikaciju, aplikovati što je moguće bliže vrhu bataka kako bi se izbegle povrede nerava i krvnih sudova.



6. Svaka pojedinačna aplikacija dostavlja uvek istu dozu od 0.3ml vaccine u nožnu muskulaturu. Povremeno promeniti iglu kako bih se izbegle povrede.



www.merial.com